

AVRIL 1950


Va

REVUE HORTICOLE

FONDÉE
EN 1829

TERRASSE FLEURIE
AU PAYS BASQUE

26, RUE JACOB
PARIS VI.




REVUE HORTICOLE

FONDÉE EN 1829 PAR LES AUTEURS
DU BON JARDINIER

COMITÉ DE DIRECTION

G. BUSTARET : Directeur de la Station centrale d'amélioration des plantes ; Prof. P. CHOUARD, Conservatoire des Arts et Métiers ; L. CUNY, Secrétaire général de la Société Nationale d'Horticulture ; E. FRANÇOIS, Gouverneur des Colonies, Président de l'Assoc. des Ingénieurs horticoles ; Prof. R. HEIM, Membre de l'Institut ; HENRY-GIRARD, ancien Président de l'Académie d'Agriculture ; Jean HENRY-GIRARD, Directeur de « La Maison Rustique » ; GUY-CHARON, Président de la Fédération de l'Horticulture et de la Pépinière ; J. LENFANT, Directeur de l'Ecole Nationale d'Horticulture ; G. MARTIN-LECOINTE, premier Vice-Président de la Société Nationale d'Horticulture ; M. VACHEROT, Vice-Président de la Fédération de l'Horticulture et de la Pépinière.



AVRIL 1950

N° 2170

122^e Année

SOMMAIRE

	Pages
Chronique horticole	99-126
Vie de la S. N. H. F.	101-126
Fenêtres et Balcons, Terrasses et Façades fleuries, par H. FUCHS	103
Les « Bosquets » de Lunéville (Avant-hier - Hier - Aujourd'hui), par E. de GANAY	111
Nouveautés	115
Quelques échos du 2 ^e Congrès International de Phyto- pharmacie (suite), par H. LAGAUE	117
Essai de classification et d'identification des principales variétés de Haricots cultivés en France (suite et fin), par R. CHOPINET, G. TRÉBUCHET et J. DROUZY	119
A propos de la Mouche des fruits (<i>Ceratitis Capitata</i> Wiedl), par L. DUPOUY	123
A propos de l'hivernation des pucerons verts du Pêcher et du Prunier, par H. MALLINJOURD	123
Revue bibliographique	125
Cornichons non cornus	125

♦ ♦ ♦

COMITÉ DE RÉDACTION

P. CHOUARD — H. FUCHS — P. CHAUMIER

♦ ♦ ♦

PRIX DE L'ABONNEMENT : 9 Numéros

France et Colonies	500 frs
Etranger	1.200 frs
Prix du numéro	70 frs
Changement d'adresse	25 frs

TÉLÉPHONE : Danton 50-33

COMPTE COURANT POSTAL : Paris 209-39

Fenêtre fleurie de Géraniums à feuilles de lierre
à Trouville (Calvados).

EDITIONS DE " LA MAISON RUSTIQUE " 26, RUE JACOB — PARIS (VI^e)

ESSAI DE CLASSIFICATION ET D'IDENTIFICATION DES PRINCIPALES VARIÉTÉS DE HARICOTS CULTIVÉES EN FRANCE (Suite et fin.)

par R. CHOPINET, G. TRÉBUCHET et J. DROUZY

Ingénieurs horticoles aux Etablissements Vilmorin Andrieux et C^{ie}

GROUPE IV - SECTION 18

(Port Rames, Gousse non parcheminée, Grain jaune, brun, rouge, violacé ou gris (1))

- A - Grain ovoïde à oblong (généralement court).
 B - Grain incarnat saumoné à jaune chamois.
 C - Grain assez petit (400), subglobuleux à ovoïde 196 - Prédome rose à rames.
 CC - Grain gros (220), ovoïde allongé, obscurément zébré jaune cuivré (2) Voir Mangetout sans fil à rames (N° 210).
 BB - Grain rouge, violet, brun ou gris.
 C - Gousse verte, grain violet prune à violet noirâtre.
 D - Grain assez petit (400) ; gousse petite (80-100 X 8-10), elliptique charnue à ronde, arquée 197 - Cerise du Japon.
 DD - Grain gros (180) ; gousse moyenne (140-150 X 16-18), elliptique, aplatie, ± arquée 198 - A rames Corail.
 CC - Gousse jaune.
 D - Grain violet prune, violet noirâtre ou brun caroube.
 E - Grain violet prune à violet noirâtre, moyen (300) ; gousse sans parchemin, moyenne (130-150 X 15-17) ; fleur rose (III) 199 - Sélection 1668-48.
 EE - Grain brun caroube à violet noirâtre, gros (220) ; gousse légèrement parcheminée à maturité, moyenne (130-160 X 13-15) ; fleur mauve (V) Voir Beurre du Mont-d'Or à rames
 DD - Grain brun sépia à gris bleuté ; gousse jaune sans parchemin, grande (200 X 20) (N° 173).
 AA - Grain oblong à réniforme ou oblong allongé à réniforme allongé. 200 - Beurre Bernois.
 B - Gousse violette ou verte.
 C - Gousse violette, elliptique ; grain subréniforme à réniforme aplati, incarnat saumoné obscurément marbré lilas Voir A rames à cosse violette (N° 214).
 CC - Gousse verte, elliptique charnue à ronde ; grain oblong allongé ou réniforme, brun bure à brun havane.
 D - Fleur blanche (I) ; grain peu ou pas caréné ; gousse verte avec filandres. 201 - Mangetout de la Vallée.
 DD - Fleur rose (III) ; grain fortement caréné ; gousse vert clair, sans filandres. 202 - Mangetout Saint-Fiacre.
 BB - Gousse jaune.
 C - Grain oblong court à oblong passant à subréniforme, brun sépia à gris bleuté ; gousse grande, large (200 X 20), elliptique, droite Voir Beurre bernois (N° 200).
 CC - Grain oblong allongé à réniforme, caréné, brun bure à brun havane, marbré plus foncé ; gousse grande (150-200 X 13-15), elliptique charnue à ronde, ± tourmentée. 203 - Saint-Fiacre beurre.

196 - PREDOME ROSE A RAMES.

DESCRIPTION : Ancienne variété à petit grain, incarnat saumoné produisant des gosses petites (70-85 X 10-12).
 Fleurs roses (III). Port : rames, touffu (hauteur 1 m. 50).

Synonyme : MANGETOUT BRESSON.

Variété affine. — ŒIL DE PERDRIX (3) : grain assez petit (400), incarnat saumoné, veiné et fréquemment lavé de lilas vers le hile qui est cerclé brun jaune. Gousse petite, vert jaune lavé rose à maturité, sans parchemin et sans filandres. Fleurs blanches.

Le Prédome rose à rames est encore cultivé localement comme mangetout.

197 - CERISE DU JAPON.

DESCRIPTION : Grain violet prune à violet noirâtre, ovoïde allongé à oblong court, plein à légèrement aplati (2 ab, 3 ab), tronqué, assez petit (400). Gousse verte, devenant jaunâtre panaché carmin à maturité, petite (80-100 X 8-10), elliptique charnue à ronde, arquée, sans parchemin, sans filandres, renfermant 6-7 grains. Extrémité obtuse à style court, moyen marginal. Axe hypocotylé et cotylédons verts. Fleurs roses (III) réunies par 5-12 en inflorescences axillaires. Port : rames (hauteur 2 m. - 2 m. 50). Feuillage vert à vert foncé, acuminé à longuement acuminé, ± réticulé. Maturité hâtive. 1^{re} fleur en 60 j. Bon pour filet en 80 j. Cycle végétatif 120 j.

Variété affine. — *Phaseolus cerasiferus*.

Variétés cultivées comme mangetout.

198 - A RAMES CORAIL.

DESCRIPTION : Grain violet noirâtre, ovoïde allongé à oblong court, plein (2a, 3a), gros (180). Gousse verte, jaunissant à maturité, moyenne (130-150 X 16-18), elliptique, aplatie, ± arquée, sans parchemin, sans filandres, renfermant 6-8 grains. Extrémité obtuse à style court, droit, ± marginal. Axe hypocotylé et cotylédons verts. Fleurs roses (III), réunies par 3-6 en inflorescences axillaires. Port : rames (hauteur 2-3 m.). Feuillage vert à vert foncé, folioles moyennes, acuminées à longuement acuminées, assez lisses. Maturité très tardive. 1^{re} fleur en 57 j. Bon pour filet en 72 j. Cycle végétatif 145 j.

Variété d'origine italienne cultivée localement comme mangetout.

(1) Certaines graines ayant, selon leur degré de maturité, des tonalités oscillant entre les bruns bure et les gris, nous avons dû inclure la teinte grise dans notre tableau de détermination des groupes et sections (N° 2155, p. 242). Pour les sections II, VIII, XIII et XVIII, lire : Grain jaune, chamois, brun, rouge, violet ou gris.

(2) Voir report, Groupe V, Section 16.

(3) Ne correspond pas à la variété ŒIL DE PERDRIX décrite dans les Plantes Potagères (Vilmorin, 1925), laquelle est à grain à tégument fond blanc panaché gris verdâtre et à gousse parcheminée.

199 - SELECTION 1668-48.

DESCRIPTION : Grain violet prune à violet noirâtre, ovoïde allongé à oblong court, plein (2a, 3a), moyen (300). Gousse jaune, moyenne (130-150 x 15-17), elliptique, droite, sans parchemin, sans filandres, renfermant 6 grains. Extrémité obtuse à style court, droit, non marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons verts.** Fleurs roses (III). **Port :** rames (hauteur 2 m. - 2 m. 50). **Feuillage** vert clair à folioles grandes, acuminées, réticulées. **Maturité** 1/2 tardive. 1^{re} fleur en 50 j. Bon pour filet en 62 j. Cycle végétatif 135 j.

200 - BEURRE BERNOIS.

DESCRIPTION : Grain brun sépia à gris bleuté, oblong court à oblong, passant à subréniforme, aplati (3b, 4b, 6b), assez gros (250). Gousse jaune, piqueté carmin à maturité, grande (200 x 20), elliptique, droite, sans parchemin, sans filandres, renfermant 6 grains. Extrémité obtuse à style court à moyen, arqué, marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons violacés.** Feuillage vert clair à folioles grandes, acuminées, réticulées. **Maturité** tardive.

Variété cultivée, surtout en Suisse, comme mangetout beurre.

201 - MANGETOUT DE LA VALLEE.

DESCRIPTION : Grain brun bure à brun havane, veiné, oblong allongé, plein à légèrement aplati (5ab), moyen (280), hile cerné brun jaune. Gousse verte, jaunissant et faiblement lavé de carmin à maturité, grande (180-250 x 12-15), elliptique charnue à ronde, tourmentée, ± récurvée, sans parchemin, avec filandres, renfermant 7-9 grains. Extrémité obtuse à style court, droit, marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons verts.** Fleurs blanches (I), réunies par 6-12 en inflorescences axillaires. **Port :** rames (hauteur 2 m. 50). **Feuillage** vert à vert foncé, à folioles grandes, acuminées à brusquement acuminées, assez lisses. **Maturité** hâtive. 1^{re} fleur en 60 j. Bon pour filet en 80 j. Cycle végétatif 120 j.

Synonymes : MANGETOUT SAINT-FIACRE A COSSE VERTE, KENTUCKY WONDER (BROWN SEED), OLD HOMESTEAD.

Variétés affines. — Mangetout de la Franche-Comté - Lyon à rames.

Variétés intéressantes pour leurs grandes gosses charnues, utilisées comme mangetout.

202 - MANGETOUT SAINT-FIACRE.

DESCRIPTION : Grain brun bure à brun havane, oblong allongé à réniforme, légèrement aplati (5b, 7b), fortement caréné, gros (280), hile ± cerné brun jaune. Gousse vert clair jaunissant et parfois faiblement lavé carmin à maturité, grande (180-220 x 12-15), elliptique charnue à ronde, tourmentée, ± récurvée, sans parchemin, sans filandres, renfermant 6-8 grains. Extrémité obtuse à style moyen, droit, marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons verts.** Fleurs roses (III), réunies par 6-12 en inflorescences axillaires. **Port :** rames (hauteur 2 m. 50). **Feuillage** vert à folioles grandes, acuminées à brusquement acuminées; ± lisses. **Maturité** 1/2 hâtive. 1^{re} fleur en 60 j. Bon pour filet en 80 j. Cycle végétatif 125 j.

Synonyme : MANGETOUT SAINT-FIACRE A COSSE BLONDE.

Variété affine. — Excelsior.

Variété intéressante comme mangetout par leurs grandes gosses charnues, sans parchemin et sans filandres.

203 - SAINT-FIACRE BEURRE.

DESCRIPTION : Grain brun bure à brun havane, fortement marbré plus foncé, oblong allongé à réniforme, légèrement aplati (5b, 7b), caréné, gros (240). Gousse jaune, se lavant parfois de carmin à maturité grande (150-200 x 13-15); elliptique charnue à ronde, récurvée, ± tourmentée, sans parchemin, sans filandres, renfermant 7-9 grains. Extrémité obtuse à style moyen, droit, marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons verts.** Fleurs blanches (I), réunies par 5-10 en inflorescences axillaires. **Port :** rames (hauteur 2 m. 50). **Feuillage** vert clair à folioles grandes, acuminées à longuement acuminées, lisses. **Maturité** hâtive. 1^{re} fleur en 55 j. Bon pour filet en 75 j. Cycle végétatif 120 j.

Variété affine. — Kentucky Wonder Wax.

Variétés intéressantes pour leurs grandes gosses charnues, sans parchemin et sans filandres consommées en mangetout beurre.

GROUPE IV - SECTION 19

(Port Rames, Gousse non parcheminée, Grain noir)

A - Grain ovoïde à ovoïde allongé (rarement oblong court); gousse jaune.

B - Fleurs blanches (I), rarement mauves (V); gousse elliptique charnue à ronde, arquée, assez petite (80-100 x 12-15) 204 - Alger Beurre noir à rames.

BB - Fleurs mauves (V); gousse elliptique aplatie, ± droite, grande, large (120-150 x 18-25) 205 - Merveille de Venise.

AA - Grain réniforme ou oblong allongé à réniforme allongé; gousse verte.

B - Grain oblong allongé à réniforme allongé, moyen (350); gousse ronde, grande (160-210 x 10-13), légèrement parcheminée Voir Sélection 1675-48 (N° 179).

BB - Grain réniforme, gros (190); gousse elliptique aplatie, grande, large (160-200 x 17-20) 206 - Sabre noir à rames.

204 - ALGER BEURRE NOIR A RAMES.

DESCRIPTION : Grain noir, ovoïde à ovoïde allongé, plein à légèrement aplati (1ab, 2ab), gros (200). Gousse jaune, elliptique charnue à ronde, arquée, assez petite (80-100 x 12-15), sans parchemin, sans filandres, renfermant 4-6 grains. Extrémité obtuse à style court à moyen, droit, marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons verts.** Fleurs blanches (I), réunies par 5-8 en inflorescences axillaires. **Port :** rames (hauteur 1 m. 50 - 2 m.). **Feuillage** vert à folioles moyennes, acuminées, ± lisses. **Maturité** 1/2 hâtive. 1^{re} fleur en 60 j. Bon pour filet en 72 j. Cycle végétatif 125 j.

Variétés affines. — Nous avons eu en culture une variété ne se différenciant que par la couleur mauve de ses fleurs. A ce sujet, notons que si les Plantes Potagères (Vilmorin 1925) donnent une couleur blanche à la fleur du H. Alger beurre noir à rames, Denaiffe le décrit à fleurs lilas pâle.

Variété cultivée comme mangetout beurre.

205 - MERVEILLE DE VENISE.

DESCRIPTION : Grain noir, ovoïde à ovoïde allongé, plein à légèrement aplati (1ab, 2ab), tronqué, gros (200). Gousse jaune, se panachant parfois de violacé à maturité, elliptique aplati, ± droite, grande, large (120-150 x 18-25), sans parchemin, sans filandres, renfermant 5-6 grains. Extrémité obtuse à style court, droit, ± marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons fortement violacés.** Fleurs mauves (V), réunies par 3-8 en inflorescences axillaires. **Feuillage** vert à folioles moyennes, acuminées, lisses. **Maturité** 1/2 tardive. 1^{re} fleur en 60 j. Bon pour filet en 78 j. Cycle végétatif 135 j.

Synonyme : BEURRE OR DU RHIN.

Variétés affines. — Beurre Mammouth, gousse jaune clair, très grande (200-220 x 25-27).

Merveille de Venise à grain blanc : Ruban d'Or. — Mêmes caractéristiques que Merveille de Venise, un peu moins vigoureux, mais à grain blanc.

Le Haricot Merveille de Venise, d'origine italienne,

est cultivé pour ses larges gousses beurre, sans parchemin et sans filandres, consommées en mangetout.

206 - SABRE NOIR A RAMES.

DESCRIPTION : Grain noir, réniforme, aplati (6-7 bc), tronqué, gros (190). Gousse verte, elliptique, aplatie, ±

droite, grande (160-200×17-20), sans parchemin, sans filandres, renfermant 6-8 grains. Fleurs mauves (V). Feuillage vert à folioles grandes. Maturité 1/2 tardive.

Variété cultivée pour ses grandes gousses sans parchemin et sans filandres consommée en mangetout.

GROUPE IV - SECTION 20

(Port Rames, Gousse non parcheminée, Grain panaché)

A - Grain panaché, tégument à fond blanc.

B - Panachure type Bicolore (I).

C - Grain ovoïde à ovoïde allongé; panachure incarnat lilacé, strié et moucheté violet noirâtre Voir Coco Bicolore du Pape (N° 181).

CC - Grain oblong; panachure rouge saumoné, strié et moucheté brun palissandre. Voir Coco Bicolore Prolifique.

BB - Panachure type Métis (fond blanc peu apparent, parfois nul), violet prune à violet noirâtre 207 - Sélection 1677-48.

AA - Grain panaché, tégument à fond coloré.

B - Grain ovoïde à oblong, plein.

C - Panachure type Deuil (mouchetée ou zébrée).

D - Grain à fond gris, obscurément piqué plus foncé et zébré noir 208 - Zébré gris.

DD - Grain à fond jaunâtre à incarnat saumoné.

E - Grain zébré ocre ou jaune cuivré.

F - Grain zébré ocre 209 - Jaune d'Or à rames.

FF - Grain obscurément marbré plus foncé et zébré jaune cuivré 210 - Mangetout sans fil à rames.

EE - Grain moucheté et strié violet prune à violet lie de vin.

F - Grain gros, franchement ovoïde; gousse elliptique, droite, faiblement parcheminée Voir Coco Rose à rames (N° 186).

FF - Grain gros ou moyen, oblong court à oblong; gousse elliptique charnue à ronde, arquée.

G - Grain très gros (160); gousse grande (160-180×18), elliptique charnue à ronde, arquée 211 - Haricot viande.

GG - Grain gros (200); gousse moyenne (130-140×13-15), elliptique charnue, très arquée 212 - Crochu de Vacqueyras.

CC - Panachure type Marbré, fond incarnat saumoné, fortement marbré violet lie de vin à violet noirâtre 213 - Beurre d'Annecy.

BB - Grain subréniforme à réniforme.

C - Panachure type Deuil.

D - Grain incarnat saumoné zébré noir; gousse verte 213 bis - Reine de France.

DD - Grain incarnat saumoné, strié, moucheté ou lavé lilas; gousse violette Voir A rames à cosse violette (N° 214).

CC - Panachure type Marbré.

D - Grain plein, moyen, subréniforme, incarnat saumoné fortement marbré violet lie de vin à violet noirâtre; gousse jaune Voir Beurre d'Annecy (N° 213).

DD - Grain aplati, gros, subréniforme à réniforme, incarnat saumoné strié moucheté ou lavé lilas; gousse violette 214 - A rames à cosse violette.

207 - SELECTION 1677-48.

DESCRIPTION : Grain panaché du type METIS à tégument à fond blanc peu apparent, parfois nul, panachure violet prune à violet noirâtre; oblong court à subréniforme, plein à légèrement aplati (3ab, 6ab), gros (220). Gousse verte, jaunissant à maturité, elliptique, arquée, assez grande (150-190×15-16), sans parchemin, sans filandres, renfermant 6 grains. Extrémité obtuse à style court, droit, marginal. Axe hypocotylé et cotylédons verts. Fleurs blanches. Port : rames (hauteur 2 m. - 2 m. 50). Feuillage vert à folioles grandes, acuminées, réticulées. Maturité 1/2 tardive, 1^{re} fleur en 64 j. Bon pour filet en 70 j. Cycle végétatif 135 j.

208 - ZEBRE GRIS.

DESCRIPTION : Grain panaché du type DEUIL, tégument à fond gris obscurément piqué plus foncé et zébré de quelques grandes stries noires, ovoïde allongé, plein (2a), gros (180). Gousse verte panachée violacée, elliptique charnue, ± droite, moyenne (110-130×14-16), sans parchemin, renfermant 5-7 grains. Fleurs mauves. Port : rames (hauteur 2,5-3 m.). Feuillage vert à folioles grandes, lisses. Maturité tardive.

Variété cultivée comme mangetout.

209 - JAUNE D'OR A RAMES.

DESCRIPTION : Grain panaché du type DEUIL, tégument à fond incarnat saumoné zébré de quelques grandes

stries jaune ocre, ovoïde allongé (2a), gros (200). Gousse verte, ± panachée de carmin, elliptique charnue, arquée, moyenne (120-140×12-15), sans parchemin, ± sans filandres, renfermant 6-8 grains. Axe hypocotylé et cotylédons verts à très faiblement violacé. Fleurs roses (III). Port : rames (hauteur 2 m.). Feuillage vert foncé à folioles grandes, acuminées, lisses. Maturité 1/2 tardive. 1^{re} fleur en 65 j. Bon pour filet en 70 j. Cycle végétatif 130 j.

Variété cultivée comme mangetout.

210 - MANGETOUT SANS FIL A RAMES.

DESCRIPTION : Grain panaché du type DEUIL, tégument à fond incarnat saumoné à chamois, obscurément marbré plus foncé et zébré de quelques grandes stries jaune cuivré, ovoïde allongé, plein à légèrement aplati (2ab), parfois tronqué, gros (220), hile cerné brun jaune. Gousse verte, jaunissant et se panachant ± de carmin à maturité, elliptique, droite, moyenne (120-130×14-15), sans parchemin, sans filandres, renfermant 6-7 grains. Extrémité obtuse à style court, droit, non marginal. Axe hypocotylé et cotylédons verts à faiblement violacés. Fleurs roses (III). Port : rames (hauteur : 2 m. - 2 m. 50). Feuillage vert à folioles moyennes, acuminées, ± lisses. Maturité 1/2 tardive, 1^{re} fleur en 61 j. Bon pour filet en 80 j. Cycle végétatif 135 j.

(1) Voir Clé de détermination des types de panachure, n° 2155, p. 240.

211 - HARICOT VIANDE.

DESCRIPTION : Grain panaché du type DEUIL, tégument à fond incarnat saumoné, strié et moucheté violet prune à violet lie de vin, oblong court à oblong plein (3a-4a), très gros (160), hile cerné jaune brun. Gousse verte panachée carmin devenant jaunâtre fortement panachée carmin à maturité, elliptique charnue à ronde, arquée, tourmentée, grande (160-180×18), sans parchemin, sans filandres. Extrémité obtuse à style moyen, droit, ± marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons verts. Fleurs roses (III).** Port : rames (hauteur 2 m. 50). **Feuillage** vert à folioles grandes, acuminées à brusquement acuminées, réticulées. **Maturité 1/2 hâtive.**

Synonyme : H. DU CHEYLARD.

Variété surtout cultivée pour la consommation de ses gousses en mangetout et aussi pour ses grains frais ou secs.

212 - CROCHU DE VACQUEYRAS.

DESCRIPTION : Grain panaché du type DEUIL, tégument à fond incarnat saumoné, strié et moucheté violet prune à violet lie de vin, grain oblong court à oblong plein (3a, 4a), gros (200), hile cerné brun jaune. Gousse verte panachée carmin devenant jaunâtre fortement panachée carmin à maturité, elliptique charnue, fortement arquée, moyenne (130-140×13-15), sans parchemin à faiblement parcheminée, sans filandres, renfermant 5-6 grains. Extrémité obtuse à style moyen, droit, marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons verts. Fleurs roses (III).** Port : rames (hauteur 2 m. 50). **Feuillage** vert à folioles moyennes, acuminées, ± réticulées. **Maturité 1/2 hâtive.**

Synonyme : CROCU DI VAQUIROS.

Même utilisation que la variété précédente.

213 - BEURRE D'ANNECY.

DESCRIPTION : Grain panaché du type MARBRE, tégument à fond incarnat saumoné, fortement marbré violet lie de vin à violet noirâtre, oblong à subréiforme, plein (4a, 6a), moyen. Gousse jaune se panachant souvent de violacé à maturité, elliptique, arquée, moyenne (140-160×13-15), sans parchemin, sans filandres, renfermant 5-7 grains.

La Revue Horticole tient à la disposition de ses lecteurs des « tirés à part » de l'Essai de classification et d'identification des principales variétés de Haricots cultivées en France. Ces « tirés à part » comprendront une table alphabétique complète des variétés mentionnées que le manque de place ne nous permet pas de publier ici.

BIBLIOGRAPHIE

- 1920 ANONYME. — Dwarf French beans at Wisley 1919. (« Journal Royal Horticultural Society », 45 : 31, 6, 333.)
- 1927 BOIS (D.). — Les plantes alimentaires chez tous les peuples et à travers les âges. I. Légumes. (P. Lechevalier, Paris.)
- 1947 BOYENVAL (J.). — Recherches sur les téguments des graines de Haricots. (« Revue Horticole », n° 2.139, mars (nouvelle série, t. XXX, n° 15.)
- 1825 CANDOLLE (DE). — Prodomus systematis naturalis regni vegetabilis. (Vol. 2, p. 352, Paris.)
- DENAÏFFE. — Les Haricots. (J.-B. Baillière et Fils, Paris, et Librairie Horticole, Paris.)
- 1931 HEDRICK (U.P.). — The vegetables of New York. (Vol. I, part. II (Beans), New-York.)
- 1901 IRISH (H.-C.). — Garden beans cultivated as esculents. (« Missouri Bot. Gard. Rpt. », 12 : 81-165 illus.)
- 1931 KOOIMAN H.-N.). Monographie. Génétique du genre PHASEOLUS (PHASEOLUS vulgaris et mult.). — [Bibliographia genetica [Wageningen]].
- 1869 MARTENS (G. von). — Die Gartenbohnen. Ihre verbreitung cultur und benützung. [Ausgabe 2, vermehrte 105 p. illus., Ravensburg.]
- 1905 OBERTHUR (R.) et DAUTHENAY (H.). — Répertoire de couleurs pour aider à la détermination des couleurs des fleurs, des feuillages et des fruits. (82, illus. Rennes et Paris [Text. et 2 volumes de planches]).
- 1947 SIMONET (M.), CHOPINET (R.) et BOUCHER (J.). — Essai de classification des variétés de Soja cultivées à Antibes (« Revue Internationale du Soja », Paris, n° 43-44 et suivants.)
- 1932 STEINMETZ (F.-H.) et ARNY (A.C.). — A classification of the varieties of field beans, PHASEOLUS vulgaris (« Journal of Agricultural Research », vol. 45, n° 1, 1^{er} juillet, 1932, Washington D. C.)
- 1907 TRACY (W.-W., Jr.). — American varieties of garden beans. (U. S. Department of Agriculture Bureau of plant industry », bulletin n° 109, 9 septembre, Washington.)
- 1947 VILMORIN (R. de). — Etude des caractères du Haricot (PHASEOLUS vulgaris L) en vue de l'établissement d'une classification agronomique. (« C.R. Acad. d'Agr. de France », tome 33, n° 12, p. 511 à 516.)
- 1856 VILMORIN-ANDRIEUX. — Description des plantes potagères. (Vilmorin, Paris.)
- 1883 VILMORIN-ANDRIEUX. — Les plantes potagères (I et 2), 2^e édition. (Vilmorin, Paris.)
- 1891 VILMORIN-ANDRIEUX. — Les plantes potagères, 3^e édition. (Vilmorin, Paris.)
- 1904 VILMORIN-ANDRIEUX. — Les plantes potagères, 3^e édition. (Vilmorin, Paris.)

Extrémité obtuse à style moyen, droit, marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons violacés. Fleurs mauves. Port :** rames (hauteur 2 m.). **Feuillage** vert clair à folioles assez grandes, acuminées, réticulées. **Maturité 1/2 hâtive, 1^{er} fleur en 58 j. Bon pour filet en 80 j. Cycle végétatif 130 j.**

Variétés affines. — Beurre de Savoie - Corne de Béliet - A rames crochét.

Variétés cultivées uniquement pour la consommation de leurs gousses en mangetout beurre.

213 bis - REINE DE FRANCE.

DESCRIPTION : Grain panaché du type DEUIL, tégument à fond incarnat saumoné zébré de quelques grandes stries noires, réniforme, aplati (7 bc), gros. Gousse verte panachée de violet, elliptique, droite, gronde (180-220×20-24), sans parchemin, sans filandres, renfermant 6-8 grains. **Fleurs mauves. Port :** rames (hauteur 2 m. - 2 m. 50). **Feuillage** vert à folioles moyennes, réticulées. **Maturité 1/2 tardive.**

Synonyme : MERE DE FAMILLE.

Variété cultivée pour ses grandes gousses mangetout.

214 - A RAMES A COSSE VIOLETTE.

DESCRIPTION : Grain incarnat saumoné, obscurément strié, moucheté ou lavé de lilas pâle, subréiforme à réniforme, aplati (6 bc, 7 bc), assez gros (250), hile cerné brun jaune. Gousse violette, elliptique, aplatie, ± droite, gronde (180-200×15-17), sans parchemin, sans filandres, renfermant 7-10 grains. Extrémité obtuse à style moyen, droit, marginal. **Axe hypocotylé et cotylédons violacés. Fleurs mauves à calice coloré (VII), réunies par 6-10 en inflorescences axillaires. Port :** rames (hauteur 2-3 m.). **Feuillage** vert lavé de violet à folioles grandes, brusquement acuminées, réticulées. **Maturité 1/2 hâtive. 1^{er} fleur en 55 j. Bon pour filet en 75 j. Cycle végétatif 125 j.**

Synonymes : MANGETOUT A COSSE VIOLETTE, PHENOMENE DE BAVIERE.

Variétés affines. — La plupart des sélections reçues sous le nom A rames à cosse violette et étudiées ont donné des gousses avec parchemin et avec filandres.

Variété cultivée pour ses grandes gousses à consommer en mangetout.